

**s331 Pseudogley-Tschernosem-Parabraunerde aus Löss und Lösslehm****Verbreitet auftretende Böden**

|                         |                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bodenformgruppe</b>  | s-L38                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| <b>Flächenanteil</b>    | 70–90 %                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Nutzung</b>          | Acker                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| <b>Relief</b>           | sehr schwach geneigter Hang                                                                                            |                                                                                                                    |
| <b>Bodentyp</b>         | Pseudogley-Tschernosem-Parabraunerde, mittel und mäßig tief entwickelt                                                 |                                                                                                                    |
| <b>Ausgangsmaterial</b> | Löss und Lösslehm                                                                                                      |                                                                                                                    |
| <b>Bodenartenprofil</b> | Ut3–4                                                                                                                  | 3–4 dm                                                                                                             |
|                         | Tu3–4                                                                                                                  | 5–6 dm                                                                                                             |
|                         | Ut3–4                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| <b>Karbonatführung</b>  | teilweise ab 6–10 dm u. Fl.                                                                                            |                                                                                                                    |
| <b>Gründigkeit</b>      | tief                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <b>Waldhumusform</b>    | keine Angabe möglich, da Bodenform nur unter landwirtschaftlicher Nutzung auftritt oder zu den organischen Böden zählt |                                                                                                                    |
| <b>Humusgehalt</b>      | Oberbod. LN                                                                                                            | mittel humos bis stark humos                                                                                       |
|                         | Unterboden                                                                                                             | schwach humos bis mittel humos                                                                                     |
| <b>Bodenreaktion</b>    | LN                                                                                                                     | sehr schwach sauer bis schwach sauer                                                                               |
|                         | Wald                                                                                                                   | keine Angabe möglich, da Bodenformgruppe unter LN bzw. unter Wald nicht auftritt oder pH-Bereich nicht bekannt ist |
| <b>Bodenschätzung</b>   | LIIb2                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| <b>Musterprofile</b>    | keine Angabe                                                                                                           |                                                                                                                    |

**Begleitböden**

stellenweise mittel tiefes Kolluvium über Pseudogley-Tschernosem-Parabraunerde

**Kennwerte**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Feldkapazität</b>          | hoch (390–420 mm)                    |
| <b>Nutzbare Feldkapazität</b> | sehr hoch (200–220 mm)               |
| <b>Luftkapazität</b>          | mittel                               |
| <b>Wasserdurchlässigkeit</b>  | mittel                               |
| <b>Sorptionskapazität</b>     | hoch (250–280 mol/z/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Erodierbarkeit</b>         | gering bis mittel                    |

**Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)**

|                                            |                                     |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Standort für naturnahe Vegetation</b>   | keine hohe oder sehr hohe Bewertung |                  |
| <b>Natürliche Bodenfruchtbarkeit</b>       | mittel bis hoch (2.5)               |                  |
| <b>Ausgleichskörper im Wasserkreislauf</b> | LN: mittel (2.0)                    | Wald: hoch (3.0) |
| <b>Filter und Puffer für Schadstoffe</b>   | LN: hoch (3.0)                      | Wald: hoch (3.0) |
| <b>Gesamtbewertung</b>                     | LN: 2.50                            | Wald: 2.83       |

**Verbreitung und Besonderheiten**

Einzelfläche im Lössgebiet der nördlichen Deckenschotterlandschaft südlich von Illerkirchberg-Oberkirchberg (Alb-Donau-Kreis)